

AULA+

PREGUNTAS IMPUGNADAS

Modelo A



Servicio
Canario de la Salud

www.aulaplusformacion.es

Pregunta 28: esta pregunta se debe ANULAR

¿Cuál es una variable cualitativa continua?

Las variables cualitativas son aquellas cuyos elementos de variación tienen un carácter cualitativo, pueden ser nominales u ordinales. Las variables cualitativas no pueden medirse cuantitativamente y sólo pueden estimarse cualitativamente. Sus valores se expresan con denominaciones. Las variables cuantitativas son discretas o continuas. Por lo tanto, **las variables cualitativas no pueden ser consideradas continuas.**

Instituto de Gestión sanitaria. Guía Metodológica de Investigación en Ciencias de la Salud. 2010.

http://www.ingesa.mscbs.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_Metodologica_Inv_CCSS.pdf

Pregunta 68. ¿Cuál de los siguientes signos es más compatible con la anorexia nerviosa?

- A) Peso del 85%-95% del ideal para la edad y/o talla.
- B) Hipermenorrea pertinaz.
- C) Miedo intenso a ganar peso.
- D) Hipertrofia de las parótidas.

Se solicita la ANULACIÓN DE LA PREGUNTA

En esta pregunta se marca como opción de respuesta "C". El encabezado de la pregunta nos pregunta por el SIGNO más compatible con la anorexia nerviosa. **La opción de respuesta "C" no es un SIGNO sino un SÍNTOMA.**

Entre los **criterios diagnósticos** que encontramos en la anorexia nerviosa **según el DSM-5:**

1. Restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que conlleva a un peso corporal marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido como un peso que es inferior al mínimo normal o, para niños y adolescentes, inferior a lo que mínimamente se espera para su edad y estatura (SIGNO).
2. **Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso**, o una conducta persistente para evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal (**SÍNTOMA**).
3. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o persistente negación del peligro que comporta el bajo peso corporal actual.

Pregunta 70. La IRAS (Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria) más frecuentes son:

- A) Infecciones urinarias.
- B) Bacteriemias asociadas a catéter.
- C) Infecciones de la herida quirúrgica.
- D) Neumonías asociadas a ventilación mecánica.

Opción dada A, pregunta se puede impugnar, solicitando cambio de respuesta a la “C”.

Según EPINE 2019 las infecciones más frecuentes en la actualidad serían: quirúrgicas, respiratorias, urinarias y bacteriemias.

1. URINARIAS.

Localización infección (grupo)	IRAS adquirida en el propio centro en el presente ingreso				IRAS adquirida en el propio centro en un ingreso previo			
	N.º Pac	% Prev	N.º Infec	% Rel	N.º Pac	% Prev	N.º Infec	% Rel
Urinarias	663	1,10	663	20,18	65	0,11	65	7,59
Quirúrgicas	688	1,14	696	21,19	482	0,80	483	56,43
Respiratorias	685	1,13	687	20,91	101	0,17	101	11,80
Bacteriemias e IAC	589	0,97	596	18,14	68	0,11	68	7,94
Otras localizaciones	629	1,04	643	19,57	138	0,23	139	16,24
Total	2928	4,84	3285	100,00	815	1,35	856	100,00

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Internet).
Estudio EPINE-EPPS nº 29: 2018, Versión 1.0 (Fecha elaboración: 11/04/2019). Página 39.

Disponible en:

<https://www.epine.es/docs/public/reports/esp/2018%20EPINE%20Informe%20Espa%C3%B1a.pdf>

Pregunta 124. RESERVA 4. En el triaje de múltiples víctimas y catástrofes, indique cuál de las siguientes NO es una herramienta de valoración útil.

- a) Valoración de trauma ABCD
- b) Triage-Revised Trauma Scored
- c) Escala CRAMS
- d) Triage SORT

Esta pregunta de ver se ANULADA ya que la opción de RESPUESTA “D” tampoco es un triaje, debería decir “SHORT” en vez de “SORT”.