

# ANÁLISIS POR TENDENCIAS


## Top 10 Número de preguntas por asignatura

8	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	8
35	PLANES PROPIOS	7
31	INFANTIL	6
3	VALORACIÓN Y CUIDADOS DE LA PIEL	5
9	NUTRICIÓN	5
5	HIGIENE DE CENTROS SANITARIOS	4
6	GERIATRÍA	4
10	NEFROUROLOGÍA	4
18	CARDIOLOGÍA	4
19	FARMACOLOGÍA	4
23	DIGESTIVO	4
26	TRAUMATOLOGÍA	4

## HISTÓRICO

Media de preguntas por examen:

INVESTIGACIÓN	8
INFANTIL	6
EPIDEMIOLOGÍA	6
MATERNAL	4
DERMATOLOGÍA	4
PAE	4
DCH	4



**ENTRAN: PLANES PROPIOS y NUTRICIÓN.**

1.- Cuando necesitamos realizar un análisis de gases arteriales mediante punción directa de una arteria, ¿cuál de las siguientes sería la de primera elección?

- A) Arteria radial
- B) Arteria carotídea
- C) Arteria femoral
- D) Arteria humeral

**Comunidad Valenciana 2008, 73.** En la obtención de muestra de sangre para gasometría de la arteria radial:

- A) La inserción de la aguja en la arteria con respecto a la muñeca será formando un ángulo de 45°.
- B) La inserción de la aguja en la arteria con respecto a la muñeca será formando un ángulo de 90°.
- C) La inserción de la aguja en la arteria con respecto a la muñeca será formando un ángulo de 30°.
- D) La inserción de la aguja en la arteria con respecto a la muñeca será formando un ángulo de 60°.

2.- Selecciona la respuesta correcta sobre la administración de gotas para los oídos

- A) Tirar de la aurícula hacia abajo y atré'ls en los niños y hacia arriba y atrás en los adultos
- B) Aplicar presión suavemente sobre la frente
- C) Solicitar al paciente que incline la cabeza hacia atrás y mire al techo
- D) Asegurarse que los dos oídos sean simétricos

**Canarias 2016, 147.** Para enderezar el conducto auditivo y facilitar la irrigación de agua durante la técnica de lavado de oído en personas adultas, se traccionará el pabellón auricular:

- A) Hacia arriba y hacia atrás.
- B) Hacia abajo y hacia atrás.
- C) Hacia arriba y hacia delante.
- D) Hacia abajo y hacia delante.

3.- Señale la definición correcta de Pterigion:

- A) Inflamación o infección de la membrana que recubre los párpados
- B) Tumor no canceroso que se inicia en la conjuntiva ocular en forma de un pequeño acúmulo de grasa
- C) Desviación de las pestañas hacia la córnea
- D) Ruptura de la conjuntiva provocada por un traumatismo ocular

4.- La complicación más común en el paciente con úlcera péptica es:

- A) Una perforación
- B) Una hemorragia
- C) Desnutrición por cambios en la dieta
- D) Obstrucción pilórica

**Castilla la Mancha, 2018, 87.** La causa mas frecuente de la hemorragia digestiva alta es:

- A) Gastritis.
- B) Úlcera péptica.
- C) Varices esofágicas.
- D) Gastropatía portal hipertensiva

5.- Señale la respuesta incorrecta de los signos y síntomas del Síndrome de Boerhaave :

- A) Dolor torácico retroesternal/esofágico que empeora con la deglución
- B) Expectorcación hemoptoica, una vez que han cesado los vómitos
- C) Hemorragia masiva y shock si se presentan desgarros importantes
- D) Dolor articular

6.- Cada articulación tiene una posición básica para la inmovilización. ¿Cuál es la posición básica para la inmovilización de la rodilla?

- A) Flexión > 90°
- B) Ángulo recto, 90°
- C) Flexión de 45 - 50°
- D) Flexión de 15° - 20°

**7.- La glándula Tiroides produce:**

- A) Estradiol
- B) Insulina
- C) Tiroxina y calcitonina
- D) Paroxitina

**8.- Ante una prostatitis aguda, señale cuál de las afirmaciones es correcta:**

- A) Para el diagnóstico es imprescindible la realización de un TAC abdominal
- B) El tratamiento antibiótico no está recomendado
- C) Se debe evitar la instrumentación uretral
- D) Se debe realizar sondaje vesical preventivo

**9.- A continuación aparecen una serie de afirmaciones respecto a la creatinina. Señale la respuesta incorrecta:**

- A) Los valores normales de creatinina en sangre en hombres están entre 15 y 30 mg/dl
- B) La creatinina sérica determina la eficacia de la función renal
- C) La creatinina es un producto terminal del metabolismo endógeno
- D) En la prueba de orina de 24 horas se mide el volumen de sangre que se limpia de creatinina endógena en 1 minuto

**10.- En la pericarditis uno de los síntomas es:**

- A) Bradicardia
- B) Dolor agudo en el pecho
- C) Hipotermia
- D) Frecuencia cardíaca normal

**Aragón 2018, 72.** ¿Qué síntoma es patognomónico de la pericarditis aguda?:

- A) Dolor torácico.
- B) Roce pericárdico.
- C) Fiebre.
- D) Disnea.

**11.- Cómo se denomina la técnica que se utiliza para la lectura del Mantoux:**

- A) Técnica de maduración
- B) Técnica de Sokal
- C) Técnica de Wallace
- D) Técnica de Clapping

**Castilla-La Mancha 1999, 49.** La forma más exacta para medir el resultado de la prueba de la tuberculina es:

- A) Técnica Sokal.
- B) Técnica de Mantoux.
- C) Técnica de Wiersy.
- D) Técnica de Madd.

**12.- De entre los cuidados de enfermería al paciente con tubo endotraqueal, señale la mejor opción:**

- A) La presión del manguito se mide al menos cada 8 horas y debe estar entre 15 a 25 mmHg
- B) La presión del manguito se mide cada 12 horas y debe estar por debajo de 15 mmhg
- C) La presión del manguito se mide cada 24 horas y debe estar por encima de 25 mmhg
- D) No es necesario medir la presión del manguito salvo que observemos que el balón está muy flojo

**Cataluña 2018, 73.** En relación con las curas de Enfermería en el paciente con tubo endotraqueal (indica la respuesta incorrecta):

- A) La salida accidental del tubo es una complicación potencial en el paciente intubado.
- B) La presión alta y mantenida del globo del neumotaponamiento puede causar isquemia por compresión.
- C) El tubo produce que el reflejo tusígeno este hiperactivo.
- D) La presión baja del globo del neumotaponamiento aumenta el riesgo de neumonía por aspiración.

**13.- De acuerdo a la fórmula de Parkland, indique el volumen de líquido que hay que perfundir en las primeras 8h a un paciente con quemaduras graves:**

- A) Perfundir el 50% del volumen total calculado en la fórmula
- B) Perfundir el 20% del volumen total calculado en la fórmula
- C) Perfundir el 40% del volumen total calculado en la fórmula
- D) Perfundir el 35% del volumen total calculado en la fórmula

**Baleares, 2008, 50.** Señala la respuesta correcta. La fórmula de Parkland sirve para:

- A) Reponer los líquidos perdidos en el paciente quemado.
- B) Se calcula los líquidos necesarios para mantener a un paciente quemado estable.
- C) Se calcula los líquidos que precisa un paciente quemado en las primeras 24 horas para mantener una volemia estable.
- D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

**14.- Según la Escala de Braden, señale a qué corresponde una puntuación de 2 en el factor de riesgo de la humedad:**

- A) Rara vez húmedo
- B) Ocasionalmente húmedo
- C) Constantemente húmedo
- D) Muy húmedo

**País Vasco, 2015, 6.** ¿Cuál de los siguientes ítems no se valora dentro de la escala Braden-Bergstrom?:

- A) Actividad – a mayor grado de actividad física, menor el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- B) Edad – a mayor edad de la persona, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- C) Humedad – cuanto mayor sea el grado de humedad de la piel, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- D) Nutrición – cuanto peor sea el estado nutricional de la persona, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.

**15.- ¿Qué Hospital fue uno de los precursores de la Hospitalización a domicilio en España?**

- A) Hospital de Calahorra
- B) Hospital Virgen-de la Salud de Toledo
- C) Hospital de Torrejón de Madrid
- D) Hospital U. Gregario Marañón de Madrid

**16.- De las siguientes afirmaciones, sobre las hemorragias quirúrgicas, señale la incorrecta:**

- A) La hemorragia primaria ocurre durante la intervención
- B) La hemorragia primaria ocurre pasadas las primeras 12 horas de la intervención
- C) La hemorragia intermedia ocurre en las primeras horas después de la intervención
- D) La hemorragia secundaria ocurre cierto tiempo después de la intervención por un vaso mal anudado, infectado o erosionado

**17.- La zona con mayor riesgo de padecer una UPP en un paciente en sedestación es:**

- A) Columna vertebral dorsal
- B) Tobillos
- C) Isquion
- D) Rodillas

**Comunidad Valenciana, 2008, 93.** Una consecuencia de la inmovilización de los pacientes es la aparición de úlceras por presión. cuando el paciente está continuamente en decúbito supino, indique en qué zona no aparecen úlceras:

- A) Isquion.
- B) Zona occipital.
- C) Sacro.
- D) Talones.

**18.- Entre las recomendaciones, en cuanto a pautas de alimentación en el embarazo , se encuentran:**

- A) Comer la carne bien cocinada para evitar la posibilidad de desarrollar Toxoplasmosis
- B) Comer el pescado bien cocinado para evitar la posibilidad de desarrollar Toxoplasmosis .
- C) Disminuir el aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega-3
- D) Disminuir la ingesta de productos lácteos

**19.- Previo a la canalización de la vía arterial, realizamos el Test de Allen. ¿Cuál es la finalidad del mismo?**

- A) Determinar si la arteria humeral es permeable
- B) Determinar si la arteria carotídea es permeable
- C) Determinar si la arteria femoral es permeable
- D) Determinar si las arterias radial y cubital son permeables

**Galicia 2006, 63.** El test de Allen se realiza para:

- A) Comprobar si existe una buena circulación venosa.
- B) Comprobar si hay circulación colateral antes de la punción de la arteria radial.
- C) Comprobar si hay circulación colateral después de la punción de la arteria radial.
- D) Comprobar si existe pulso radial.

**20.- Según las intervenciones NIC, en la administración por vía inhalatoria, indique la respuesta correcta:**

- A) Ayudar al paciente a colocarse el inhalador en boca o nariz
- B) El paciente esperará 35 minutos entre una y otra inhalación
- C) El paciente respirará más rápido
- D) El paciente no tiene que aguantar la respiración

**Cataluña 2018, 3.** Con el sistema de inhalador de polvo seco multidosis tipo Accuhaler, en caso de necesitar una segunda dosis, cuál es el intervalo mínimo que hace falta esperar desde la inhalación anterior:

- A) 30 segundos.
- B) 1 minuto.
- C) No hace falta esperar.
- D) 30 segundos.

**21.- ¿Qué rama de la farmacología estudia la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos?**

- A) Farmacocinética
- B) Farmacodinamia
- C) Farmacognosia
- D) Farmacogenómica

**Extremadura, 2007, 41.** La Farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia:

- A) El movimiento de los fármacos en el organismo en función del tiempo y la dosis.
- B) El movimiento de los fármacos en el organismo en función del tiempo.
- C) El movimiento de los fármacos en el organismo en función de la dosis.
- D) Ninguna es correcta.

**22.- El periodo prodrómico en un proceso infeccioso es aquel que:**

- A) Va desde que se manifiestan los síntomas no específicos hasta que aparecen los síntomas específicos de la infección
- B) Se hacen más evidentes los síntomas específicos
- C) Los síntomas se manifiestan en un área concreta
- D) Va desde el momento en el que los síntomas empiezan a disminuir hasta el estado normal de salud

**23.- Señale la respuesta incorrecta de las siguientes afirmaciones relacionadas con la meningitis bacteriana:**

- A) Es muy frecuente la cefalea durante el proceso febril
- B) La aparición de crisis convulsivas o déficits neurológicos pueden ser el primer dato de infección
- C) En los pacientes con ataxia, nistagmus y afectación de pares craneales, hay que sospechar infección
- D) Los pacientes con meningitis bacteriana presentan siempre un líquido cefalorraquídeo normal

**Castilla-La Mancha, 2010, 35.** ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con la clínica de una meningitis?

- A) Aparición de convulsiones.
- B) Vómitos y cefaleas.
- C) Signo de Brudzinsky y signo de Kerning positivos.
- D) Todas son correctas.

**24.- En una intoxicación por paracetamol, señala la manifestación clínica correcta:**

- A) Arritmia
- B) Hipotensión, edema pulmonar e hipoxemia
- C) Pruebas anormales de función hepática
- D) Visión borrosa

**Extremadura, 2008, 62.** Entre las siguientes afirmaciones, una es falsa en relación con la intoxicación por Paracetamol. Señale cuál:

- A) La sobredosis puede producir anemia hemolítica y necrosis miocárdica.
- B) La dosis tóxica en adultos es aproximadamente 250mg/kg.
- C) La clínica se va agravando con las horas.
- D) Si la ingesta es reciente está indicado lavado gástrico y carbón activado.

**25.- Indica en qué tipo de intoxicación está contraindicado el uso de carbón activado:**

- A) Intoxicación por fenitoina
- B) Intoxicación por digoxina
- C) Intoxicación por litio
- D) Intoxicación por salicilatos

**Extremadura, 2018, 97.** El carbón activado está contraindicado o es ineficaz, en qué tóxico de los siguientes:

- A) Antidepresivos tricíclicos.
- B) Organofosforados.
- C) Ácido bórico.
- D) Arsénico.

**26.- La demencia de los cuerpos de Lewy difusos, se considera una demencia :**

- A) Degenerativa
- B) Secundaria
- C) Vascular
- D) Etiología Múltiple

**27.- El dolor secundario a una lesión de fibras sensitivas de un nervio periférico que refiere el paciente como quemazón y ardor es un dolor tipo:**

- A) Visceral
- B) Neurogénico
- C) Nociceptivo
- D) Psicógeno

**28.- El protocolo de Baile et al. en España (EPICEE), de cómo dar malas noticias, cuenta con los siguientes pasos:**

- A) Entorno, estrategia, asertividad y empatía
- B) Asertividad, percepción del paciente y estrategia
- C) Entorno, percepción del paciente, invitación, comunicación, empatía y estrategia
- D) Percepción del paciente, estrategia, inclinación, empatía, entorno y asertividad

**29.- ¿Qué modificaciones funcionales se producen por el envejecimiento en el aparato locomotor?**

- A) Aumento de fragilidad ósea y de la contractilidad y tono muscular
- B) Aumento de fragilidad ósea y de la elasticidad muscular
- C) Disminución de la fragilidad ósea y de la contractilidad y tono muscular
- D) Aumento de la fragilidad ósea y disminución de la contractilidad y tono muscular

**30.- Los factores más importantes que predisponen la aparición de la anorexia y bulimia en los adolescentes son:**

- A) La presión social, las características familiares y de personalidad
- B) Los cambios hormonales en la pubertad
- C) Las relaciones sociales exclusivamente
- D) Las exigencias profesionales

**31.- Según el Calendario de Vacunación Infantil 2018 de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes vacunas se debe administrar a un adolescente de 14 años?**

- A) Mene 1 (Meningococo C)
- B) HB1 (Hepatitis B)
- C) WZ (Varicela)
- D) Td (Tétanos - Difteria)

**Castilla y León 2018, 2.** En el calendario vigente de vacunación infantil en la Comunidad de Castilla y León, ¿qué dosis de vacunas se aplicarán a los 11 meses de edad?

- A) Hepatitis B, tétanos, Difteria, Tosferina acelular, Polio inactivada, Haemophilus influenzae-b, Neumococo 13v.
- B.) Meningococo C, Sarampión, Rubeola y parotiditis.
- C) A esta edad no se aplicara ninguna vacuna.
- D) Hepatitis B, Tetanos, Difteria, Tosferina acelular, Polio inactivada, Haemophilus influenzae-b, Neumococo 13v y meningococo C.

**32.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones es errónea a la hora de atender a un niño con un proceso convulsivo?**

- A) Sujetar al niño
- B) Colocar el cuello en hiperextensión
- C) Retirar objetos peligrosos
- D) Aflojar la ropa

**Canarias , 2001, 123.** Entre las actividades de enfermería a pacientes con convulsiones se incluyen todas las siguientes excepto:

- A) Administrar oxígeno.
- B) Sujetar al paciente.
- C) Protegerlo para evitar traumatismos.
- D) Valorar el nivel de consciencia durante la convulsión.

**33.- En cuanto a la ictericia del recién nacido:**

- A) Es fisiológica después del 7.º-8.º día de vida en el recién nacido a término
- B) Siempre implica una patología
- C) La Fototerapia como tratamiento de la Ictericia Neonatal no tiene complicaciones
- D) En los recién nacidos alimentados con leche materna, la ictericia es más frecuente y dura más tiempo

**País Vasco 2015, 43.** Entre otras causas la ictericia fisiológica del neonato es debida a:

- A) Pérdida de temperatura en el nacimiento.
- B) Bajos niveles de vitamina K.
- C) Exceso de almacenamiento de glucosa.
- D) Policitemia neonatal.

**34.- ¿Qué parámetros son característicos en el recién nacido prematuro?**

- A) Cráneo blando, escaso panículo adiposo y transparencia venosa
- B) Predominio de flexión en el tono muscular y presencia de panículo adiposo
- C) Presencia de cartílago y pezón definido
- D) Predominio de extensión en el tono muscular y piel sonrosada

**Castilla y León, 2018, 57.** Señale la respuesta falsa con respecto al niño prematuro:

- A) Se considera niño prematuro cuando su nacimiento es anterior a la 37 semana de gestación.
- B) El lanugo es abundante por todo el cuerpo pero el cabello es escaso y fino.
- C) Ante su inmadurez pulmonar, la administración de oxigenoterapia debe mantenerse para lograr valores de saturación de oxígeno entre 99% y 100%.
- D) La cabeza es proporcionalmente grande en relación con el cuerpo.

**35.- De forma específica, la valoración nutricional del niño perseguirá los siguientes objetivos excepto:**

- A) Orientar sobre el origen (primario o secundario) del trastorno nutricional
- B) Evaluar las alteraciones morfológicas y la gravedad del proceso
- C) Valorar el consumo concreto de hidratos de carbono
- D) Valorar las alteraciones metabólicas consecuencia del trastorno nutricional

**36.-Cuál de los siguientes síntomas y signos no sería una manifestación clínica precoz para identificar algún trastorno metabólico hereditario:**

- A) Letargo
- B) Dificultad para la alimentación
- C) Convulsiones
- D) Aspecto rosado de la piel

**37.- De los cambios siguientes, ocurridos en la mujer en el climaterio, ¿cual aparece a una edad media más temprana?**

- A) Atrofia mamaria
- B) Atrofia urogenital
- C) Osteoporosis
- D) Sofocos

**Región de Murcia, 2004, 35.** El síntoma más frecuente en la menopausia es:

- A) Palpitaciones.
- B) Sofocos.
- C) Atrofia genital.
- D) Insomnio.

**38.- ¿Qué cambios hematológicos ocurren en la mujer gestante?**

- A) Aumento de hemoglobina
- B) Aumento de la vida media de las plaquetas



- C) Disminución de los leucocitos
- D) Eritropoyesis aumentada con hipervolemia

**39.- La bola de células que se produce después de las primeras 4 mitosis tras la fecundación, se denomina:**

- A) Blastocito
- B) Blastómero
- C) Trofoblasto
- D) Embrioblasto

**40.- Según los mecanismos de defensa de Freud, cuando hablamos de protegernos contra la realidad desagradable estamos utilizando el mecanismo de:**

- A) Represión
- B) Regresión
- C) Negación
- D) Compensación

**Cantabria, 131, 2010:** El mecanismo de defensa por el que un individuo enfermo no reconoce su padecimiento se denomina:

- A) Supresión.
- B) Negación.
- C) Regresión.
- D) Ansiedad.

**41.- ¿Cuál de las siguientes vacunas se puede administrar por vía intradérmica?**

- A) Rabia
- B) Hepatitis B
- C) Difteria / Tétanos
- D) Varicela

**42.- Señale la respuesta correcta según la NANDA respecto a la definición de diagnóstico enfermero:**

- A) Es una formulación de una conclusión resultante del reconocimiento analítico
- B) Es una frase o Jermiño conciso que resume un grupo de indicadores empíricos de un individuo
- C) Es un juicio clínico sobre las respuestas de un individuo, familia o comunidad a problemas de salud reales o potenciales
- D) Es la determinación de la naturaleza y extensión de los problemas que presentan los pacientes.

**La Rioja, 103, 2006:** Definición de diagnóstico de enfermería:

- A) Es el juicio clínico, que la enfermera identifica y le comenta al médico.
- B) Es el juicio clínico sobre la respuesta que experimenta un individuo, familia, y/o comunidad a problemas de salud real o potenciales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma independiente y autónoma.
- C) Es el tratamiento que se pone al individuo en su domicilio.
- D) Es el tratamiento sobre la respuesta que experimenta un individuo, familia, y/o comunidad a problemas de salud real o potenciales, que la enfermera pone en el domicilio.

**43.- Indique cuál de los siguientes conceptos se corresponde con la definición de desinfección:**

- A) Conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos patógenos a un medio
- B) El grupo de procesos físicos capaces de eliminar las formas vegetativas de microorganismos en objetos inanimados incluidos las esporas
- C) Conjunto de procedimientos físicos y mecánicos, empleados para la siembra de los gérmenes patógenos
- D) El proceso por el que se destruyen los microorganismos patógenos pero no todas las esporas ni los gérmenes resistentes

**Andalucía, 64, 2003:** ¿Qué es la desinfección?

- A) La eliminación o destrucción de toda forma de vida microbiana, incluidas las formas de resistencia (esporA).
- B) La eliminación o destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos residentes (y de su potencial infeccioso), en un objeto inanimado. No se incluye la eliminación de las formas de resistencias esporuladas.
- C) La eliminación o destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos residentes en piel o mucosas, para anular su potencial infeccioso.
- D) La remoción del material extraño de los objetos.

**44.- Cuando, entre los factores relativos a la aplicación de un programa de cribado, nos referimos a que el programa logra lo que pretende conseguir en una población determinada, nos referimos a:**

- A) Efectividad
- B) Factibilidad
- C) Eficacia
- D) Eficiencia

**45.- Cuando el sistema de clasificación de la calidad de la evidencia según GRADE señala “es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque podrían existir diferencias sustanciales” se está refiriendo a una calidad de la evidencia:**

- A) Alta
- B) Moderada
- C) Baja
- D) Muy baja

**Andalucía, 56, 2018:** Respecto a la prevención de úlceras por presión (UPP) en la valoración del riesgo tiene una evidencia baja o muy baja (sistema GRADE) : Indique la correcta:

- A) Utilizar una escala validada (Braden, EMINA).
- B) Registrar en la historia clínica de la persona la valoración del riesgo realizada.
- C) Valorar el riesgo de presentar UPP en todos los pacientes.
- D) Clasificar a las personas, tras la valoración, en las categorías de medio, bajo o alto riesgo y aplique medidas en función de este riesgo.

**46.- La desviación estándar se define como:**

- A) El promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado
- B) La diferencia entre un valor determinado de la variable y la media aritmética
- C) El cuadrado de la varianza
- D) Un promedio de las desviaciones individuales de las variables

**47.- Entre los elementos básicos del proceso de comunicación, el mensaje que el receptor devuelve, y que indica si el receptor ha comprendido el significado del mensaje del emisor, se conoce como:**

- A) Retroalimentación
- B) Referente
- C) Mensaje
- D) Canal

**Asturias, 18, 2013:** Con respecto a la comunicación señale la respuesta incorrecta:

- A) La comunicación es un proceso circular, configurado por el elemento de retroalimentación.
- B) La comunicación es un proceso circular y discontinuo.
- C) La comunicación es irreversible.
- D) En el proceso de comunicación el emisor y el receptor constantemente se intercambian los papeles.

**48.- El consentimiento informado está relacionado con el principio bioético de:**

- A) Beneficiencia
- B) Autonomía

- C) Justicia
- D) No maleficencia

**Región de Murcia, 11, 2007:** El consentimiento informado, garantiza el respeto al principio de:

- A) Beneficencia.
- B) Autonomía.
- C) Inferencia.

**49.- Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones Públicas, a través de sus servicios de salud, desarrollarán de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:**

- A) Se establecerá una jornada complementaria que será sólo de aplicación a las mujeres de la misma categoría profesional
- B) La adopción sistemática de mejores turnos de trabajo para las mujeres versus los hombres
- C) La programación de una jornada irregular anual, aún a costa de exceder el máximo anual
- D) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del SNS

**Cantabria, 30 2017:** De acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale cuál de las siguientes no constituye una de las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas para la integración del principio de igualdad en la política de salud:

- A) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.
- B) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
- C) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud.
- D) La presencia mayoritaria de mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

**50.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, Ley 55/2003, de 16 de diciembre, regula las causas de extinción del personal estatutario fijo, entre las que se encuentra:**

- A) Incapacidad temporal
- B) Comisión de servicio
- C) Jubilación
- D) Promoción interna

**Comunidad Valenciana, 6, 2013:** Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud, no es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo:

- A) La jubilación.
- B) La suspensión de funciones.
- C) La incapacidad permanente en los términos previstos en la indicada ley.
- D) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración al nombramiento.

**51.- La oxigenoterapia de alto flujo se caracteriza por:**

- A) La  $FiO_2$  resultante es variable
- B) La inhalación de aire enriquecido con  $O_2$  al mismo tiempo que de aire ambiental
- C) El aporte constante de la concentración de  $O_2$  independientemente del patrón ventilatorio del paciente
- D) Estar indicada en pacientes con capacidad respiratoria con patrón estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos normales

**52.- Señale los signos y síntomas del Síndrome de Menier:**

- A) Presión severa en el oído afectado e hipoacusia
- B) Fiebre  $> 38^\circ$  y dolor
- C) Diarrea vespertina y heces acólicas
- D) Presión en oído afectado, vértigo rotacional y Tinnitus o acúfenos

**Castilla-La Mancha, 89, 2018:** Uno de los siguientes síntomas NO es característico del síndrome de Menière:

- A) Vértigo periférico.
- B) Dolor del oído afectado.
- C) Sensación de taponamiento del oído afectado.
- D) Tinnitus.

**53.- Definimos la presión intraocular como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionar sus estructuras y sin alterarse su función, ¿Cuáles son los valores normales de esta presión?**

- A) Entre 0 y 5 mmHg
- B) Entre 10 y 21 mmHg
- C) Entre 30 y 50 mmHg
- D) > 51 mmHg

**54.- Tras un sangrado gástrico, la hemorragia puede hacer que las heces sean de un color:**

- A) Negro alquitranado (Melenas)
- B) Posos de café
- C) Bilioso
- D) Bianquecino

**Castilla-La Mancha, 74, 2008:** La hemorragia digestiva puede manifestarse por:

- A) Hematemesis, melenas, sangre oculta en heces, rectorragias y hematoquecia.
- B) Hematemesis, hemoptisis, rectorragias, sangre oculta en heces y hematoquecia.
- C) Hemoptisis, melenas, hematoquecia y rectorragias.
- D) Hematemesis, epistaxis, sangre oculta en heces, rectorragias y melenas.

**55.- Entre los ejercicios de movilidad, que no de tono, para la recuperación del esguince de tobillo, está recomendado:**

- A) Movimientos circulares con el tobillo
- B) Marcha intentando subir y bajar escaleras
- C) Empujar hacia arriba objetos pesados con el dorso del pie
- D) Rodar un objeto de un pie a otro

**56.- En un paciente con fractura de una extremidad que refiere dolor profundo, pulsátil y persistente, que continúa en aumento a pesar de la administración -ae opioides; poemos sospechar de:**

- A) Síndrome compartimental
- B) Síndrome de embolia gaseosa
- C) Shock hipovolémico
- D) Hipoglucemia

**País Vasco, 36, 2002:** El dolor intenso y pulsátil que no cede con analgésicos y aumenta cuando hay una fractura, es una manifestación de:

- A) Embolia grasa.
- B) Osteonecrosis.
- C) Miositis osificante.
- D) Síndrome compartimental.

**57.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en los pacientes con hipotiroidismo avanzado?**

- A) No suelen aumentar de peso
- B) Se prolongan los efectos analgésicos, sedantes y anestésicos en ellos
- C) El hipotiroidismo avanzado no influye en cambios en la piel o el pelo del paciente
- D) Los cambios que se pueden producir en el cuerpo no se relacionan con el habla, las manos o los pies

58.- ¿Cuál de las siguientes patologías supone una contraindicación para la cateterización vesical suprapúbica?

- A) Rotura uretral
- B) Litiasis en cuello vesical
- C) Fractura pélvica
- D) Presencia o sospecha de tumor vesical

59.- De las siguientes intervenciones de enfermería para un paciente con problemas vasculares periféricos, señale la respuesta incorrecta:

- A) Mantener los MMII con baja temperatura, ya que la vasoconstricción mejora el problema
- B) Recomendar que evite la ropa y los accesorios apretados
- C) Recomendar que no este de pie o sentado sin moverse durante periodos prolongados de tiempo
- D) Alentar la deambulaci3n

60.- Cuando hablamos de disminuci3n de gasto cardiaco segun NANDA, ¿cuál de las siguientes respuestas se considera una alteraci3n de la poscarga?

- A) Aumento de peso
- B) Tos
- C) Taquicardia
- D) Oliguria y disnea

61.- ¿Qué intervenci3n enfermera (NIC) forma parte de los cuidados en el tromboembolismo pulmonar?

- A) Retirar tromboprofilaxis despu3s del 3mbolo
- B) No har3n falta medias ni otras medidas de compresi3n
- C) No realizar cambios posturales
- D) Observar si hay s3ntomas de oxigenaci3n tisular inadecuada

**Cantabria, 118, 2017:** Indique que actividades de enfermer3a se deben realizar en el tromboembolismo pulmonar:

- A) Elevar la cama del paciente a una posici3n semi-flower.
- B) Canalizar una v3a perif3rica.
- C) Colocar equipo para la medici3n de presi3n venosa central.
- D) Todas son correctas.

62.- El reflejo que se investiga estimulando el borde externo de la planta del pie se denomina :

- A) Reflejo patelar
- B) Reflejo de Aquiles
- C) Reflejo superficial
- D) Babinski

**Regi3n de Murcia, 11, 2018:** Si al pasar un instrumento como una aguja por la parte lateral del pie del reci3n nacido se produce una extensi3n del dedo gordo y la separaci3n de los dem3s dedos del pie nos estamos refiri3ndonos a:

- A) Reflejo de Gallant.
- B) Reflejo de Babinski.
- C) Reflejo de marcha.
- D) Reflejo de presi3n plantar.

63.- Segun el grado de profundidad de una quemadura, indique cu3les son las caracter3sticas de una quemadura de segundo grado

- A) Afecta s3lo a la epidermis
- B) Afecta a la epidermis y parte de la dermis
- C) Afecta a la epidermis, dermis y m3sculo
- D) Afecta al tejido 3seo

**Región de Murcia, 101, 2018:** Las quemaduras de segundo grado profundas son:

- A) Aquellas que afectan a la epidermis.
- B) Aquellas que afectan a la parte superficial de la dermis.
- C) Aquellas que afectan a la parte profunda de la dermis.
- D) Aquellas que afectan a músculos y tendones.

**64.- Sobre las variables que mide la Escala de Braden, indique la respuesta incorrecta:**

- A) Percepción sensorial y exposición a humedad
- B) Perfusión tisular y oxigenación
- C) Irritabilidad y pérdida de peso
- D) Movilidad, nutrición y peligros de lesiones cutáneas

**País Vasco, 6, 2015:** ¿Cuál de los siguientes ítems no se valora dentro de la escala Braden-Bergstrom?

- A) Actividad – a mayor grado de actividad física, menor el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- B) Edad – a mayor edad de la persona, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- C) Humedad – cuanto mayor sea el grado de humedad de la piel, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
- D) Nutrición – cuanto peor sea el estado nutricional de la persona, mayor es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión.

**65.- La atención en el domicilio a pacientes con patología crónica de baja complejidad se lleva a cabo a través del servicio de:**

- A) Seguimiento a domicilio por parte del equipo de Atención Primaria
- B) Equipo de emergencia domiciliaria
- C) Hospitalización a domicilio
- D) Enfermera gestora de casos

**La Rioja, 25, 2017:** La definición “El conjunto de actividades que tienen por objeto proporcionar atención sanitaria al individuo y a la familia en su domicilio, de acuerdo con sus necesidades, asumiendo con ellos la corresponsabilidad del cuidado continuo e integral, en coordinación con los demás miembros del equipo y con otros servicios sanitarios y sociales” corresponde a :

- A) Atención domiciliaria.
- B) Asistencia domiciliaria.
- C) Hospitalización a domicilio.
- D) Visita domiciliaria.

**66.- ¿Cuál de los siguientes criterios se considera de exclusión para la Cirugía Mayor Ambulatoria?**

- A) Mayor de 60 años
- B) Carencia de persona responsable en su domicilio
- C) Enfermos diabéticos, aunque estén controlados
- O) Enfermos que hayan sido tratados con antineoplásicos

**67.- Según la clasificación del sobrepeso y la obesidad en adultos, de acuerdo con el índice de masa corporal, la Obesidad tipo 11 equivale a un Índice de Masa Corporal:**

- A) < 30
- B) 25-29,9
- C) 35-39,9
- D) > 40

**Canarias, 10, 2016:** Una persona adulta con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 37, según la OMS, presenta:

- A) Obesidad tipo I.
- B) Obesidad tipo II.
- C) Sobrepeso.
- D) Obesidad tipo III.

**68.- Las necesidades energéticas en el anciano, con respecto a la edad adulta:**

- A) Disminuyen en un 50% respecto de la edad adulta
- B) Aumentan en un 25% respecto de la edad adulta
- C) Siguen siendo las mismas respecto a la edad adulta
- D) Disminuyen en un 15% respecto a la edad adulta

**Castilla y León 2008, 20.** Entre los 65 y 70 años puede considerarse que las necesidades energéticas con respecto a la edad adulta:

- A) Disminuyen en un 15%.
- B) Disminuyen en un 50%.
- C) Aumentan en un 25%.
- D) Son las mismas.

**69.- ¿Qué organismo autonómico recoge las notificaciones por sospecha de reacción adversa a un medicamento (RAM)?**

- A) Ministerio de Sanidad
- B) Centro Autonómico de Farmacovigilancia
- C) Dirección General de Atención Especializada
- D) Departamento de Farmacología Hospitalaria

**Andalucía 2016, 39.** El Sistema Español de Farmacovigilancia está integrado por:

- A) 17 Centros Autonómicos y un Centro Coordinador ubicado en la División de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
- B) 10 Centros Autonómicos y 2 Centros Coordinadores dependientes del ministerio de sanidad
- C) 10 Centros Autonómicos y 5 Centros Coordinadores dependientes del ministerio de sanidad
- D) 17 Centros Autonómicos y un Centro Coordinador ubicado cada año en una comunidad

**70.- Entre las acciones farmacológicas que pueden producir los glucocorticoides, se encuentra :**

- A) Pérdida de sodio y agua
- B) Hipoglucemia
- C) Incremento de la masa muscular
- D) Aparición de edemas

**71.- ¿Cómo se denomina al nivel más bajo del medicamento, en el suero sanguíneo , alcanzado justo antes de la siguiente dosis pautada?**

- A) Inicio
- B) Concentración Valle
- C) Concentración Pico
- D) Meseta

**72.- En cuanto al virus de la Hepatitis D, es cierto que:**

- A) La transmisión es vía oral
- B) No existe vacuna
- C) El período de incubación es mayor a 180 días
- D) No hay evolución hacia la cronicidad

**Canarias 2016, 64.** En relación con la Hepatitis D, Agente Delta o Hepatitis Delta, señale la respuesta CORRECTA.

- A) Recibir muchas transfusiones de sangre es un factor de riesgo.
- B) Su vía de transmisión es la fecal-oral.
- C) Sólo se encuentra en personas portadoras del virus de la Hepatitis B.
- D) Si está infectada durante el embarazo, la madre puede transmitirle el virus al bebé.

**73.-Cuál de las siguientes actuaciones, en un paciente con lesiones múltiples, es la prioritaria:**

- A) Controlar la hemorragia
- B) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
- C) Prevenir y tratar el choque hipovolémico
- D) Valorar las lesiones de cabeza y cuello

**Baleares, 67, 2011:** Señale la respuesta incorrecta en relación a la valoración inicial / primaria de un paciente politraumatizado:

- A) Hay que mantener la vía aérea con control de la columna vertebral.
- B) En la valoración de la ventilación hay que valorar la frecuencia respiratoria y el tipo de respiración y hay que inspeccionar, palpar y auscultar el cuello y el tórax para localizar cualquier tipo de signo de compromiso respiratorio.
- C) Durante la valoración de la circulación hay que observar la perfusión tisular, relleno capilar y el color de la piel. Si presenta hemorragias, hay que comprimirlas.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**74.- Para la clasificación de las víctimas por prioridades ante una catástrofe, señale qué debe cumplir una tarjeta de evacuación:**

- A) La tarjeta de evacuación debe ser colocada en la ropa de la víctima
- B) La tarjeta verde se pondrá en pacientes cuya asistencia se puede demorar 6 horas
- C) La tarjeta roja identificará a los pacientes con fracturas sin problemas hemodinámicos
- D) El nombre y el apellido del paciente debe aparecer obligatoriamente en la tarjeta

**Canarias, 2016, 99.** En situaciones de catástrofes, el proceso de clasificación de pacientes denominado START (Simple Triage And Rapid Treatments), reconoce cuatro categorías diferentes entre las víctimas. Señale la opción CORRECTA en relación a estas cuatro categorías mencionadas.

- A) Leve, Reservado, Expectante, Muerto.
- B) Inmediato, Menor, Expectante, Muerto.
- C) Inmediato, Retrasado, Menor, Muerto.
- D) Leve, Menor, Reservado, Expectante.

**75.- Según la OMS, el suicidio:**

- A) No es una prioridad de salud pública
- B) Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo
- C) Se produce sólo en países de altos ingresos
- D) No es prevenible

**Extremadura 2007, 73.** La mayor incidencia en suicidio consumado se da en:

- A) Mujeres mayores de 60 años.
- B) Adolescentes.
- C) Varones mayores de 60 años.
- D) Niños.

**76.- Una característica de la demencia es :**

- A) Un desarrollo rápido
- B) Un lenguaje prolijo, confuso, tenso e irrelevante
- C) El nivel de consciencia no está afectado
- D) El sueño con inversión día y noche, insomnio onirismo y pesadillas

**País Vasco, 2006, 52.** Señale la opción correcta referida a la demencia:

- A) La demencia se caracteriza por un deterioro errático y en declive de la función mental.
- B) La demencia por infartos múltiples a menudo se confunde con la enfermedad de Alzheimer.
- C) Los cambios característicos de la demencia se dividen en: cognitivos, funcionales y conductuales.
- D) Todas las opciones son correctas.

**77.- La escala de gravedad de la mucositis de la OMS se mide con una puntuación de:**



- A) De 0 a 4
- B) De 10 a 15
- C) De 12 a 18
- D) No existe ninguna escala

**78.- Indique que evalúa el cuestionario de Barber:**

- A) El esfuerzo del cuidador
- B) La fragilidad del anciano
- C) El deterioro cognitivo
- D) La fuerza motora

**Castilla y León 2006, 32.** En la prevención y detección de problemas en el anciano se emplea el Cuestionario de Barber, a partir del cual deducimos si un anciano sugiere situación de riesgo. ¿Cuál es la puntuación mínima o a partir de cuál sugiere que está en situación de riesgo? Cuando al pasarle el Cuestionario da como resultado:

- A) Más de dos puntos.
- B) Seis puntos.
- C) Un punto.
- D) Nueve puntos.

**79.- El uso de varios tipos de medicamentos en las personas mayores puede suponer :**

- A) Aumento de la contractilidad del tono muscular
- B) Interacciones que incrementan las reacciones adversas
- C) Mejora de la adherencia terapéutica
- D) Evita el riesgo de caídas y fracturas

**80.- En la anorexia nerviosa, ¿qué hormona se ve aumentada cuando la pérdida ponderal de peso es > 25 %?**

- A) Estradiol
- B) LH,FSH (Gonadotrofinas)
- C) IGF I
- D) GH (Hormona del crecimiento)

**81.- Según el Calendario Oficial de la Vacunación de la Comunidad de Madrid, ¿a qué edad administramos las vacunas del sarampión-rubeola-parotiditis(TV) y la varicela(WZ)?**

- A) 15 meses
- B) 6 años
- C) 4 años
- D) 12 años

**Asturias, 35, 2013:** ¿A qué edad se administra la vacuna del Sarampión-Rubéola-Parotiditis según el calendario vacunal infantil del Principado de Asturias?

- A) Los 6 meses y 3 años.
- B) A los 15 meses y 3 años.
- C) A los 4 meses y 4 años.
- D) A los 6 meses y 4 años.

**82.- En cuanto a los malos tratos en la infancia, señale la respuesta correcta:**

- A) Las lesiones músculo-esqueléticas no son frecuentes
- B) El acogimiento familiar es una figura jurídica por la que se integra al menor en una familia sin sus padres biológicos
- C) La tutela administrativa es la única medida básica de protección ante los malos tratos en la infancia
- D) El riesgo de maltrato infantil aumenta cuanto mayor edad tengan los padres

**83.- En los lactantes ; los principales responsables de las gastroenteritis son:**

- A) Bacterias
- B) Parásitos
- C) Virus
- D) Toxinas

84.- Señale qué tipo de heces presentará un niño que tiene aumento de motilidad:

- A) Heces duras
- B) Heces blandas o de aspecto normal
- C) Heces líquidas con leucocitos
- D) Heces con sangre y aumento de leucocitos

85.- Según la estrategia IHAN ¿A qué edad es recomendable la introducción de la alimentación complementaria?

- A) 4 meses
- B) 2 meses
- C) 6 meses
- D) 10 meses

86.- Señala cuál de los siguientes hitos se corresponden con el desarrollo de un niño sano de 6 meses:

- A) Se sienta sin soporte o apoyo
- B) Camina solo
- C) Pronuncia de 4 a 6 palabras
- D) Presión pulgar-otro dedo

**Andalucía, 116, 2016:** Carmen de 26 años acude a la consulta de enfermería para seguimiento protocolizado de su hijo Carlos de 6 meses de edad.. Carmen nos comenta que el niño ha cambiado mucho, que antes era muy tranquilo y que desde hace 2 meses está muy irritable y llora continuamente. Por motivos laborales el padre está fuera desde hace 2 meses y apenas se ven.

Reconoce que la vuelta al trabajo dentro de dos semanas la tiene un poco estresada pero que ella quiere lo mejor para su hijo y ha mantenido la lactancia materna exclusiva. De momento no ha precisado guardería. No hay antecedentes neonatales y patológicos destacables.

Durante la evaluación del desarrollo físico y psicosocial destacamos una significativa disminución del percentil en talla y peso con respecto a la última visita de los 4 meses.

A los 4 meses : Talla P60 , Peso P60 y Perímetro craneal P50. En la actual : Talla P15, Peso P15 y Perímetro craneal P50.

Durante la exploración física encontramos: criptorquidia en testículo izquierdo y fimosis .

Explorando su desarrollo psicomotor observamos que se gira sobre si mismo, se lleva los pies a la boca pero no es capaz de mantenerse sentado sin apoyo. Carlos balbucea y hace vocalizaciones interactivas con su madre.

Comprobamos estado vacunal previo y administramos las vacunas oportunas, informando de las no incluidas en el calendario sistemático local.

Durante toda la visita hacemos promoción y prevención en las áreas de la alimentación, salud bucodental, sueño, prevención de accidentes, tabaquismo y fotoprotección.

Destacando que Carmen comenta que desde que su marido se marchó a trabajar fuera, ha vuelto a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día, lo que le apena mucho pues consiguió dejarlo durante el embarazo con ayuda de su matrona y ahora aunque le gustaría no puede dejar el hábito. Durante la exploración comprobamos que Carlos no mantiene la sedestación sin apoyo. Indique la correcta:

- A) En un signo de alerta respecto al desarrollo psicomotor acorde a su edad.
- B) Hasta los 9 meses no se considera signo de alerta la ausencia de sedestación sin apoyo.
- C) Debemos derivar a su pediatra para valoración urgente.
- D) Las respuestas A y C son correctas.

87.- ¿Cuáles son los síntomas más asociados a la menopausia?

- A) Cambios en la piel y trastornos gastrointestinales
- B) Infecciones urinarias de repetición y síntomas vasomotores

- C) Síntomas vasomotores y vaginales
- D) Disfunciones sexuales e incontinencia fecal

**Región de Murcia, 35, 2004:** El síntoma más frecuente en la menopausia es:

- A) Palpitaciones.
- B) Sofocos
- C) Atrofia genital
- D) Insomnio

**88.- ¿Qué maniobra de Leopold nos permite medir el grado de encajamiento del feto?**

- A) La primera
- B) La segunda
- C) La tercera
- D) La cuarta

**89.- El método anticonceptivo hormonal recomendado en la mujer durante el periodo de lactancia es:**

- A) Progesterona
- B) Estrógenos
- C) Gestógenos y Estrógenos
- D) No se puede tomar un anticonceptivo oral durante la lactancia

**Galicia, 110, 2016:** Acude a la consulta una paciente con 28 años para revisión de herida de cesárea. Le da el pecho a su bebé y nos pide consejo sobre qué método anticonceptivos será el más adecuado en su caso. Señale la respuesta incorrecta:

- A) Métodos barrera.
- B) Implante subdérmico.
- C) Inyección trimestral de progesterona.
- D) Anticoncepción hormonal combinada estrógeno+progestágeno.

**90.- La técnica Phillips 66, consiste en:**

- A) Conocer las opiniones de algunos miembros de la comunidad
- B) Realización de entrevistas personales en grupos de 6
- C) La aportación de ideas de todos los componentes del grupo para posteriormente priorizarlas
- D) Dividir al grupo en grupos pequeños de 6 personas durante 6 minutos para que expresen ideas sobre el tema a tratar

**Madrid, 36, 2014:** Señale la respuesta INCORRECTA. El Phillips 6/6

- A) Es una técnica de discusión en grupo.
- B) Consta de grupos de 6 personas que discuten durante 6 minutos.
- C) No permite generar tormenta de ideas.

**91.- La vacuna de la Fiebre Amarilla está contraindicada para el siguiente segmento de población:**

- A) Personas  $\geq$  60 años
- B) Mujeres embarazadas
- C) Niños menores de 6 meses
- D) Niños mayores de 6 años

**92.- Según la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos de la Comunidad de Madrid, la enfermera hospitalaria que coordina la continuidad de cuidados del paciente crónico con los recursos extra-hospitalarios, es la enfermera :**

- A) Gestora de casos
- B) De continuidad asistencial
- C) Educadora en autocuidados
- D) De atención al paciente

**93.- El procedimiento en el que se inactivan todas las formas vegetativas bacterianas, virus y hongos y la mayoría de las esporas bacterianas para conseguir un nivel adecuado que permita un uso seguro para el paciente es:**

- A) Antisepsia
- B) Asepsia
- C) Desinfección de nivel Alto
- D) Esterilización

**94.- El indicador que resulta de dividir el número de nacimientos anuales entre el número de mujeres entre 15 y 45 años multiplicado por mil, se denomina :**

- A) Tasa de natalidad
- B) Tasa de crecimiento natmal
- C) Tasa de fecundidad
- D) Tasa de crecimiento poblacional

**Región de Murcia, 56, 2007:** Indique el índice que corresponde con tasa de fecundidad:

- A)  $N.º \text{ de nacidos vivos} / n.º \text{ mujeres edad fértil} \times 1000.$
- B)  $N.º \text{ nacimientos} / n.º \text{ mujeres} \times 1000.$
- C)  $N.º \text{ nacidos vivos} / n.º \text{ adolescentes} \times 1000.$

**95.- Para que estadísticamente una distribución se considere normal debe cumplir, al menos, uno de estos requisitos:**

- A) El 100% de los valores deben estar entre la media y 2 desviaciones estándar por encima y por debajo
- B) Prácticamente el 100% de los valores deben estar entre la media y 3 desviaciones estándar por encima y por debajo
- C) Ser leptocúrtica
- D) Ser asimétrica

**96.- En relación al Consentimiento Informado, según lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento:**

- A) En cualquier momento
- B) Siempre, bajo la conformidad de sus familiares
- C) No cabe este supuesto
- D) Se otorgará el consentimiento por representación

**Castilla-La Mancha, 10, 2010:** ¿Cuándo puede un paciente, revocar libremente por escrito su consentimiento para una intervención?

- A) Antes de las 24 horas para la intervención quirúrgica en cuestión.
- B) En cualquier momento.
- C) En cualquier momento, salvo que se trate de intervención programada.
- D) Antes de las 12 horas para la intervención.

**97. Dentro del Consentimiento Informado, según lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento:**

- A) Estrategia de Salud y Hábitos de vida
- B) Financiar proyectos de investigación para patologías específicas
- C) Estrategia de mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios
- D) Estrategia de guiar las decisiones de Salud Pública a través de la epidemiología

**98.- Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención y Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde a:**

- A) Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- B) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
- C) Servicios de Medicina Preventiva

D) Servicios de Prevención de enfermedades infecciosas

**Galicia, 8, 2006:** La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde:

- A) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- B) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- C) A la Inspección General del Estado.
- D) Al Servicio de Prevención de Riesgos.

**99.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, la planificación y evolución de los cuidados de enfermería, así como la aplicación terapéutica de enfermería, son:**

- A) Documentación imprescindible para cumplimentar las Instrucciones Previas
- B) Documentación integrante de la Historia Clínica del paciente
- C) Documentación no obligatoria en la red hospitalaria del SNS.
- D) Documentación secundaria para cumplimentar la solicitud del catálogo de prestaciones

**100.- Atendiendo a la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, son funciones de la Autoridad en Salud Pública:**

- A) Las actuaciones relacionadas con la aplicación de la legislación vigente en materia de Sanidad Mortuoria, en evitación de los riesgos derivados de las prácticas tanatológicas
- B) El ordenamiento de la función de compra de servicios sanitarios, con la distribución del presupuesto sanitario en función de la actividad y los objetivos anuales
- C) La descripción secuencial de las competencias de la figura del Defensor del Paciente encargado de gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias relativas a los derechos y obligaciones de los pacientes
- D) La organización del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid atendiendo a factores geográficos y sociales

**101.- Según el C.D.C., ¿cada cuánto tiempo debe hacerse la sustitución de los sistemas de administración continua intravenosa para el mantenimiento aséptico de los catéteres?**

- A) Cada 48 horas, salvo sangre y hemoderivados
- B) Con una frecuencia superior a 96 horas e inferior a 7 días salvo sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas
- C) Con una frecuencia superior a 48 horas e inferior a 96 horas salvo sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas
- D) Los sistemas de administración de sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas se deben sustituir cada 48 horas

**102.- ¿Qué inconveniente puede presentar el óxido de etileno como método de esterilización?**

- A) Admite materiales termolábiles
- B) Es más barato que la esterilización por vapor de agua
- C) Su toxicidad
- D) Necesita alcanzar los 200°

**Canarias, 41, 2016:** ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la esterilización con óxido de etileno?:

- A) Alta penetrabilidad en los paquetes y lúmenes.
- B) Requiere aireación.
- C) Es seguro para el personal y el medio ambiente.
- D) Se emplea en una cámara de gran volumen.

**103.- Una opacificación del cristalino del ojo se denomina :**

- A) Presbicia
- B) Glaucoma
- C) Catarata

D) Degeneración maculopapilar

**Murcia, 10, 2004:** La catarata se define cómo:

- A) Una opacidad del cristalino.
- B) Una opacidad de la córnea.
- C) Lesión de cuerpo vítreo.
- D) Un aumento de la tensión ocular.

**104.- Un paciente que es consciente de su problema y que ha decidido superarlo, pero él aún no ha decidido actuar, ¿en qué fase se encuentra según Prochaska y Diclemente?**

- A) Espera
- B) Precontemplación
- C) Mantenimiento
- D) Contemplación

**Andalucía, 36, 2018:** Basándonos en las fases de cambio del modelo transteórico de Prochaska y Diclemente, cuando una persona empieza a pensar que es una buena idea dejar el tabaco, pero no fija una fecha para ello, ¿en qué fase se encuentra?

- A) Fase de Preparación.
- B) Fase Contemplativa.
- C) Fase Precontemplativa.
- D) Fase de Mantenimiento.

**105.- ¿En qué tipo de fractura tendríamos que aplicar un vendaje de Velpeau?**

- A) Fractura de fémur
- B) Fractura de tercio proximal de húmero
- C) Fractura de muñeca
- D) Fractura de pelvis

**Región de Murcia, 83, 2018:** La finalidad del vendaje de Velpeau es:

- A) Inmovilizar el hombro.
- B) Comprimir la clavícula.
- C) Protección de la herida.
- D) Realizar compresión progresiva

**106.- Con respecto a la menopausia, el alcoholismo :**

- A) Retrasa la fecha de la aparición de la menopausia
- B) Anticipa la fecha de la aparición de la menopausia
- C) Disminuye la sintomatología climatérica
- D) Disminuye los valores de tensión arterial sistólica

**107.- Respecto al empleo de un torniquete colocado para contener una hemorragia arterial. ¿Cómo se debe proceder?**

- A) Abrir el torniquete cada cierto tiempo a fin de que se irrigue el miembro
- B) Aplicar el torniquete en la parte distal del miembro afecto, por debajo de la herida
- C) Aplicar el torniquete directamente sobre la herida
- D) Aplicar el torniquete en la parte proximal del miembro afecto, por encima de la herida

**Región de Murcia, 5, 2009:** Cuando se aplica un torniquete, ¿qué medidas se tomarán para evitar consecuencias graves por su uso?:

- A) Aflojar cada cinco minutos para evitar isquemias irreversibles.
- B) No aplicaremos nunca torniquete y utilizaremos otras técnicas.
- C) Se girará rápidamente hasta que no fluya sangre.

**108.- La valoración funcional en el anciano, que evalúa las actividades básicas de la vida diaria, se mide a través de:**

- A) Índice de Barthel
- B) Escala de Northon
- C) Escala de Pfeiffer
- D) Escala de Filadelfia

**Murcia, 74, 2006:** Entre las escalas de valoración en la atención al anciano (escala de valoración geriátrica) encontramos la de valoración funcional, llamada:

- A) Escala o índice de Barthel.
- B) Escala o índice de Gram.
- C) Escala de Norton.

**109.- La mejor forma de controlar la infección por Clostridium Difficile es:**

- A) Precauciones contra agentes de transmisión aérea
- B) Precauciones contra gotas
- C) Precauciones de contacto
- D) Uso de mascarilla y puerta cerrada de la habitación

**Comunidad Valenciana 2018, 61:** En un brote de infección por Clostridium difficile, ¿Cuál es el método de higiene de manos recomendados (asumiendo el uso de los guantes) cuando se atiende a pacientes en aislamiento por esta infección?

- A) Utilizar solución hidroalcohólica después de atender al paciente.
- B) Agua y jabón antes y después de atender al paciente o de contacto con el entorno del paciente dado que es más eficaz la eliminación de las esporas.
- C) Utilizar solución hidroalcohólica antes y después de atender al paciente o de contacto con el entorno del paciente, ya que el alcohol es esporádico.
- D) Se puede usar indistintamente agua y jabón o solución hidroalcohólica, ambos son igualmente eficaces en la eliminación de las esporas

**110.- ¿Cuál es la función de una dieta rica en fibra parcialmente fermentable o insoluble?**

- A) Aumentar la motilidad gastrointestinal
- B) Enlentecer la absorción de glucosa y colesterol
- C) Estimular la absorción de algunos minerales
- D) Tener efectos probióticos