

Revisado dicho examen, se ha encontrado esta pregunta con base bibliográfica para impugnar:

8. ¿De cuántos ítems consta la escala de recuperación postanestésica de Aldrete modificada para pacientes de cirugía ambulatoria?

- a) 5
- b) 7
- c) 8
- d) 10

Los ítems de dicha escala, serían 5 y no 10 como ha indicado el tribunal.

Anexo 11. Criterios de alta

Modalidad	Puntos	Criterio
Actividad	2	Mueve las 4 extremidades.
	1	Mueve dos extremidades.
	0	No mueve las extremidades.
Respiración	2	Respira y tose normalmente.
	1	Disnea o respiración limitada.
	0	Apnea.
Circulación	2	T.A. \pm 20% nivel preanestésico.
	1	T.A. \pm 20-50% nivel preanestésico.
	0	T.A. \pm 50% nivel preanestésico.
Saturación	2	SpO ₂ > 92% con aire ambiente.
	1	Necesario O ₂ suplementario para mantener SpO ₂ > 90%.
	0	SpO ₂ < 92% con O ₂ suplementario.
Conciencia	2	Completamente despierto.
	1	Despierta al llamarlo.
	0	No responde.

<https://www.msrebs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/guiaCMA.pdf>